

**Склад:** 1 таблетка містить – основні речовини: діоксид кремнію (210 мг), мікрокристалічна целюлоза;

допоміжні речовини: цукрова пудра, крохмаль картопляний.

**Дата виготовлення та строк придатності:**

дату виготовлення вказано на упаковці.

**Строк придатності:** 3 роки з дати виготовлення.

**Умови зберігання:** зберігати в сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці при температурі від 0°C до 25°C та відносній вологості повітря не більше 75 %.

**Рекомендації щодо споживання:**

рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело ентеросорбентів з метою профілактики та пом'якшення перебігу при харчових отруєннях різного походження (в т.ч. грибами та алкоголем), гострих кишкових інфекціях, шлункових розладах, гепатитах (в т.ч. вірусних гепатитах А і В), нирковій та печінковій недостатності, алергічних захворюваннях, дерматитах, ендогенній інтоксикації, дисбактеріозі. Сприяє адсорбції з шлунково-кишкового тракту і виведенню з організму екзо- та ендогенних токсичних речовин різного походження (в т.ч. продуктів життєдіяльності патогенних мікроорганізмів, харчових та бактеріальних алергенів). Опосередковано сприяє послабленню токсико-алергічних реакцій, зниженню метаболічного навантаження на органи детоксикації (в першу чергу — печінку та нирки), корекції обмінних процесів і імунного статусу, усуненню дисбалансу біологічно активних речовин в організмі, посилює перистальтику кишечника.

**Спосіб застосування та рекомендована**

**добова доза:** вживати дорослим та дітям віком від 3-х років і старше:

Вік дитини	Середня вага дитини	Середня разова доза таблеток, штук	Середня добова доза таблеток, штук
3-4 роки	14-16 кг	2 таблетки	6 таблеток
5-6 років	18-20 кг	3 таблетки	9 таблеток

дорослим та дітям віком від 7 років і старше – по 3-4 таблетки 3-4 рази на добу у проміжках між прийомами їжі, запивати питною водою.

Курс споживання визначає лікар індивідуально.

**Особливості застосування:** вживати не раніше, ніж за 1 годину до прийому їжі, запиваючи питною водою. Подрібнення або розжовування таблеток підвищує ефективність сорбції, але не є обов'язковим.

**Застереження щодо споживання (дітьми, вагітними жінками, літніми людьми, спортсменами та алергіками):** перед застосуванням необхідна консультація лікаря. Примітка для осіб, що страждають на цукровий діабет: 1 таблетка містить 0,26 г сахарози (еквівалент 0,026 хлібних одиниць).

**Протипоказання:** індивідуальна несприйнятливості компонентів, вагітність та період лактації, виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки у стадії загострення, виразки та ерозії слизової оболонки кишечника, шлункові та кишкові кровотечі, кишкова непрохідність. Додаток дієтична. Не є лікарським засобом.

**Форма випуску:** таблетки №10, № 24.

**Маса нетто, г:** вказано на упаковці.

**Назва (найменування) та повна адреса**

**виробника:** Україна, ТОВ «ОМНІФАРМА КІІВ», 02088, м. Київ, вул. Леніна, 55, [www.omnifarma.kiev.ua](http://www.omnifarma.kiev.ua)

**Адреса потужностей об'єкта виробництва (місцезнаходження):**

8300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченко, 100

ТУ У 15.8-33082808-001:2008

Вік дитини	Середня вага дитини	Середня разова доза таблеток, штук	Середня добова доза таблеток, штук
3-4 роки	14-16 кг	2 таблетки	6 таблеток
5-6 років	18-20 кг	3 таблетки	9 таблеток

**Состав:** 1 таблетка содержит — основные вещества: диоксид кремния (210 мг), микрокристаллическая целлюлоза; вспомогательные вещества: сахарная пудра, крахмал картофельный.

**Дата изготовления и срок годности:** дата изготовления указана на упаковке.

**Срок годности:** 3 года с даты изготовления.

**Условия хранения:** хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от 0°C до 25°C и относительной влажности воздуха не больше 75 %.

**Рекомендации относительно потребления:** рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник энтеросорбентов с целью профилактики и ослабления симптомов при пищевых отравлениях различного происхождения (в т.ч. грибами и алкоголем), острых кишечных инфекциях, желудочных расстройствах, гепатитах (в т.ч. вирусных гепатитах А и В), почечной и печеночной недостаточности, аллергической заболеваемости, дерматитах, эндогенной интоксикации, дисбактериозе. Способствует адсорбции из желудочно-кишечного тракта и выведению из организма экзо- и эндогенных токсических веществ разного происхождения (в т.ч. продуктов жизнедеятельности патогенных микроорганизмов, пищевых и бактериальных аллергенов). Опосредованно способствует уменьшению проявлений токсико-аллергических реакций, снижению метаболической нагрузки на органы детоксикации (в первую очередь — печень и почки), коррекции обменных процессов и иммунного статуса, устраниванию дисбаланса биологически активных веществ в организме, усиливает перистальтику кишечника.

**Способ применения и рекомендуемая суточная доза:** употреблять взрослым и детям в возрасте от 3-х лет и старше:

Возраст ребенка	Средний вес ребенка	Средняя разовая доза таблеток, штук	Средняя суточная доза таблеток, штук
3-4 года	14-16 кг	2 таблетки	6 таблеток
5-6 лет	18-20 кг	3 таблетки	9 таблеток

взрослым и детям в возрасте от 7 лет и старше — по 3-4 таблетки 3-4 раза в сутки в промежутках между приемами пищи, запивать питьевой водой.

Курс потребления определяет врач индивидуально.

**Особенности применения:** употреблять не раньше, чем за 1 час до приема пищи, запивая питьевой водой. Измельчение или разжевывание таблеток повышает эффективность сорбции, но не является обязательным.

**Предостережение относительно потребления пищевого продукта определенными категориями населения (детьми, беременными женщинами, пожилыми людьми, спортсменами и аллергиками):** перед применением необходима консультация врача. Примечание для лиц, которые страдают сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0,26 г сахарозы (эквивалент 0,026 хлебных единиц).

**Противопоказания:** индивидуальная невосприимчивость компонентов, беременность и период лактации, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в стадии обострения, язвы и эрозии слизистой оболочки кишечника, желудочные и кишечные кровотечения, кишечная непроходимость. Добавка диетическая. Не является лекарственным средством.

**Форма выпуска:** таблетки №10, №24.

**Масса нетто, г:** указано на упаковке.

**Название (наименование) и полный адрес производителя:** Украина, ООО «ОМНИФАРМА КИЕВ», 02088, г. Киев, ул. Ленина, 55, [www.omnifarma.kiev.ua](http://www.omnifarma.kiev.ua)

**Адрес мощностей объекта производства (местонахождение):** 08300, Киевская обл., г. Борисполь, ул. Шевченко, 100  
ТУ У 15.8-33082808-001:2008

Возраст ребенка	Средний вес ребенка	Средняя разовая доза таблеток, штук	Средняя суточная доза таблеток, штук
3-4 года	14-16 кг	2 таблетки	6 таблеток
5-6 лет	18-20 кг	3 таблетки	9 таблеток