

ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату **ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ (CARVO ACTIVATUS)**

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
15.11.2013 р. №976
Реєстраційне посвідчення
№UA/9148/01/01.

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 таблетка містить вугілля активоване 0,25 г (250 мг);

допоміжні речовини: крохмаль картопляний, тальк.

Лікарська форма.

Таблетки. Таблетки чорного кольору круглої форми з плоскою поверхнею.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка». 61010, Україна, м. Харків, вул. Гордієнківська 1.

Фармакотерапевтична група. Ентеросорбенти. Код АТС А07В А01. Вугілля рослинного походження, що завдяки спеціальній обробці (активації) набуває великої сорбційної поверхні і здатне поглинати гази, алкалоїди, ендо- та екзотоксини і інші хімічні сполуки. Вугілля активоване у таблетках має дещо меншу адсорбційну здатність, ніж у формі порошку. Препарат не токсичний, добре виводиться з організму через кишечник. Препарат із кишечника не всмоктується і повністю виводиться з каловими масами через 8-24 години.

Показання для застосування. Гострі отруєння побутовими, промисловими та харчовими отрутами, лікарськими препаратами; отруєння алкалоїдами, солями важких металів; диспепсія, метеоризм; підготовка до рентгенологічних досліджень; харчові токсикоінфекції.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату. Виразки шлунково-кишкового тракту, шлункові кровотечі.

Належні заходи безпеки при застосуванні. При супутній фармакотерапії вугілля активоване приймати за 1-1,5 години до або після прийому лікарських засобів або їжі у зв'язку з адсорбуючими властивостями препарату. При наявності гіповітамінозу, яким може супроводжуватися тривале застосування вугілля активованого, необхідно призначати полівітаміни. Жінкам, які приймають протизаплідні препарати, рекомендується у період лікування вугіллям активованим використовувати інші протизаплідні засоби. Кал після прийому препарату забарвлюється у чорний колір.

Особливі застереження. *Застосування у період вагітності або годування груддю.* Протипоказань немає. *Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні ав-*

тотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає. **Діти.** Препарат не застосовувати дітям віком до 3 років.

Спосіб застосування та дози. **Дорослі:** звичайна доза становить 3-6 таблеток 3-4 рази на добу. При отруєннях та інтоксикаціях призначати у дозі 20-30 г на прийом у вигляді водної суспензії в 0,5-2 склянках води. Така суспензія використовується і для промивання шлунка. При підвищенні кислотності дорослим призначати 1-2 г препарату 3-4 рази на добу. Для досягнення більш швидкого та вираженого ефекту таблетки можна подрібнити і приймати у вигляді суспензії (на 0,5 склянки води). **Діти віком від 3 років:** звичайна доза становить 2-4 таблетки 3-4 рази на добу; у разі діареї дозу збільшити до 4-5 таблеток 3-4 рази на добу. При різних отруєннях дітям від 3 до 7 років призначати внутрішньо у дозі 5 г 3 рази на добу; дітям віком від 7 років призначати внутрішньо у дозі 7 г 3 рази на добу. Дітям вугілля активоване завжди призначати у вигляді суспензії подрібнених таблеток у невеликій кількості води, після приймання якої необхідно випити склянку води. Курс лікування при гострих захворюваннях становить 3-5 днів, при хронічних захворюваннях, зумовлених ендогенними інтоксикаціями - 10 - 15 днів.

Передозування. Значне перевищення максимальних разових доз призводить до побічної дії: нудоти, блювання та запорів, які зникають після відміни препарату.

Побічні ефекти. Можливі прояви підвищеної чутливості; запори або діарея, які легко усуваються відміною препарату і призначенням симптоматичної терапії. Можливий розвиток нудоти та блювання. При тривалому застосуванні може спостерігатись нестача вітамінів, гормонів, жирів, білків, що потребує лікарської корекції. У разі появи будь-яких небажаних явищ пацієнту необхідно звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Завдяки адсорбуючій властивостям вугілля активоване здатне зменшувати ефективність лікарських засобів, які приймаються одночасно з ним. Тому при супутній фармакотерапії вугілля активоване слід приймати за 1-1,5 години до або після прийому лікарських засобів.

Термін придатності. 5 років. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці, окремо від речовин, що виділяють гази та пари, при температурі не вище 30 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 10 таблеток у блістерах. По 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в паці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду 15.11.2013 р.