

# ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

# СОРБЕКС®

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

02.09.2013 р. № 771

Реєстраційне посвідчення

№ UA/10156/01/01

## Склад лікарського засобу:

*діюча речовина:* 1 капсула містить вугілля активованого 0,25 г (250 мг);

*допоміжні речовини:* желатин, заліза оксид чорний (Е 172), діамантовий чорний (Е 151).

## Лікарська форма. Капсули тверді.

Вміст твердої желатинової капсули – порошок чорного кольору.

## Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ «ВАЛАРТІН ФАРМА».

Україна, 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Чайки, вул. Грушевського, 60.

**Заявник:** ТОВ «ВАЛАРТІН ФАРМА», Україна.

## Фармакотерапевтична група.

Ентеросорбенти. Код АТС А07В А01.

Ентеросорбент СОРБЕКС® чинить детоксикаційну дію.

Активна речовина лікарського засобу СОРБЕКС® – вугілля активоване рослинного походження з розвинуеною активною поверхнею, здатне адсорбувати гази та рідкі токсичні сполуки, що утворюються і накопичуються у надлишковій кількості при гострих та хронічних захворюваннях або потрапляють в організм зовні.

Вугілля активоване є нетоксичною інертною речовиною. Під час перебування в організмі воно не зазнає хімічних змін та метаболічних перетворень, не всмоктується з просвіту кишечника, не потрапляє за межі шлунково-кишкового тракту, не виявляється в будь-яких концентраціях у біологічних рідинах і видалається з організму через кишечник.

## Показання для застосування.

СОРБЕКС® застосовують:

– при хронічних отруєннях побутовими і промисловими токсинами (алкалоїдами, солями важких металів, іншими речовинами), продуктами харчування, лікарськими препаратами, алкогольно-харчових перевантаженнях з метою зменшення поглинання, попередження подальшого всмоктування і прискорення видалення з організму токсичних речовин;

– при проживанні у несприятливих екологічних умовах або дії шкідливих виробничих чинників, зміні звичайного способу харчування під час відпустки, відрядження, подорожей;

– при розладах та інфекційних захворюваннях шлунково-кишкового тракту (диспепсія, метеоризм, кишкові інфекції, гострі та хронічні вірусні гепатити);

– при захворюваннях, що супроводжуються синдромом ендогенної інтоксикації: гострих та хронічних ураженнях печінки, нирок, алергічних, аутоімунних та онкологічних захворюваннях, а також при підвищеному вмісті холестерину.

## Протипоказання.

Індивідуальна підвищена чутливість до сорбенту. Виразкові та ерозивні ураження шлунково-кишкового тракту у стадії загострення, шлунково-кишкова кровотеча, кишкова непрохідність.

## Належні заходи безпеки при застосуванні.

Одночасне приймання препарату та їжі зменшує адсорбційну активність лікарського засобу, тому СОРБЕКС® приймають за 1 - 1,5 години до або після вживання їжі.

Тривалий прийом (понад 15 діб) може супроводжуватися порушеннями всмоктування та спричиняти в організмі дефіцит вітамінів, гормонів, жирів, білків, що потребує відповідної лікарської або дієтичної корекції.

## **Особливі застереження.**

Кал після прийому лікарського засобу СОРБЕКС® забарвлюється у чорний колір.

При наявності гіповітамінозу, яким може супроводжуватися тривале застосування вугілля активованого, необхідно призначати полівітаміни.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Дані про негативний вплив лікарського засобу СОРБЕКС® у період вагітності або годування груддю не відзначалися.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботи з іншими механізмами.**

СОРБЕКС® не протипоказаний при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

## **Діти.**

Дітям до 7 років недоцільно застосовувати препарат у цій лікарській формі.

## **Спосіб застосування та дози.**

При метеоризмі та диспепсії дорослим застосовувати по 1 - 3 капсули 3 - 4 рази на добу. При отруєннях та інтоксикаціях дорослим застосовувати по 2 - 6 капсул 3 рази на добу.

Дітям старше 7 років застосовувати по 1 - 3 капсули 3 - 4 рази на добу.

Препарат застосовують за 1,5 - 2 години до або після їди чи прийому лікарських засобів, запиваючи водою.

Курс лікування при гострих станах становить до 3 - 5 днів, при хронічних захворюваннях, які зумовлені ендогенними інтоксикаціями, – до 10 - 15 днів.

## **Передозування.**

Значне перевищення максимальних разових доз може призвести до побічної дії: нудоти, блювання, запорів.

## **Побічні ефекти.**

Можливі нудота і блювання. Тривале застосування може супроводжуватися розладом функції кишечника (діарея, запор), що легко усуваються припиненням прийому препарату і призначенням симптоматичної терапії. Тривалий прийом (понад 15 діб) може супроводжуватися порушеннями всмоктування та спричиняти в організмі дефіцит вітамінів, гормонів, жирів, білків, що потребує відповідної лікарської або аліментарної корекції.

*При прояві будь-яких побічних ефектів, про які не вказано в інструкції для застосування, терміново повідомте про це лікаря!*

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Завдяки адсорбуючим властивостям вугілля активоване здатне зменшувати ефективність лікарських засобів, які приймають одночасно з ним. Тому при супутній фармакотерапії СОРБЕКС® приймають за 1 - 1,5 години до або після прийому інших лікарських засобів.

За умови дотримання способу застосування препарат можна застосовувати в комплексній терапії іншими лікарськими засобами.

## **Термін придатності.**

3 роки.

## **Умови зберігання.**

Зберігати в сухому місці при температурі не вище 25 °С, окремо від речовин та матеріалів, які виділяють гази та пари.

Зберігати у недоступному для дітей місці!

## **Упаковка.**

Капсули по 0,25 г № 10 (10x1) по 1 блістеру у пацці; № 20 (10x2) по 2 блістери у пацці; № 200 (2x100) по 100 блістерів у пацці.

## **Категорія відпуску.**

Без рецепта.

**Дата останнього перегляду.** 02.09.2013 року.